

A CULTURA DO CAJUEIRO EM MATO GROSSO

CARLOS TÁVORA
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
tropicaldptecnico@fogliatto.com.br

CONDIÇÕES DE PLANTIO

- ESPAÇAMENTO: 9m x 7m ou 10m x 7m
- CULTIVARES: CCP 09, CCP76, EMBRAPA 51 E BRS 226.
- TIPO DE MUDA: MUDA ENXERTADA .
- ÉPOCA DE PLANTIO: OUTUBRO A JANEIRO
- ÉPOCA DE COLHEITA: JUNHO A OUTUBRO
- INÍCIO DA PRODUÇÃO: 3 ANOS
- TIPO DE SOLO: TODOS, NÃO SUJEITOS AO ENCHARCAMENTO.



HISTÓRICO DA CULTURA

- ATÉ 1997 – ÁREAS DE CAJUEIRO COMUM;
- 1998 – 100ha EM GAÚCHA DO NORTE;
- 1999 -2001 – 800ha NA BAIXADA CUIABANA;
- 2001 – 240ha EM BARRA DOS BUGRES;
- 2002 – 100ha EM TORIXORÉU E 115 HÁ EM NOVA MUTUM;
- 2002 a 2010 – 540ha EM TERRA NOVA DO NORTE.

CONDIÇÕES DE MANEJO

- CALAGEM DO SOLO
- ADUBAÇÃO FOSFATADA NA COVA DE PLANTIO (EVITAR ESTERCOS)
- ADUBAÇÕES MENSASIS NO 1º ANO DE CULTIVO
- CONTROLE DE INVASORAS
- PODE-SE FAZER CONSÓRCIO ATÉ O 3º ANO
- PODA DE CONDUÇÃO E RETIRADA DA INFLORESCÊNCIA ATÉ O 2º ANO



2005/07/01





PRAGAS DO CAJUEIRO EM MT

- BROCA DO TRONCO
- TRIPES DE CINTA VERMELHA
- PERCEVEJOS
- BROCA DAS PONTAS
- LAGARTA SAIA JUSTA



DOENÇAS DO CAJUEIRO EM MT

- ANTRACNOSE – Ataca ramos, folhas, flores e frutos
- RESINOSE – Ataca ramos grossos e o tronco principal.
- SECA DOS PONTEIROS – ataca inflorescencias ramos e folhas.
- MOFO PRETO – ataca parte interna das folhas.









CONDIÇÕES DE COLHEITA

- APROVEITAMENTO DA CASTANHA E DO PEDÚNCULO
- COLHEITA DIARIA PARA O PEDÚNCULO
- COLHEITA SEMANAL PARA A CASTANHA
- PRODUÇÃO/HÁ DE 15000 KG DE CASTANHA 12.000 KG DE PEDUNCULO A PARTIR DO 8º ANO DE PLANTIO
- COMPRA DA PRODUÇÃO: COOPERNOVA



2010/10/25





2010/09/11

The background is a solid blue color with a decorative wavy border at the top. The border consists of several overlapping, curved lines in various shades of blue and cyan, creating a dynamic, flowing effect.

MUITO OBRIGADO

PEIXOTO DE AZEVEDO

ABRIL 2012